

This exam paper is available in both Danish and English. The English version appears after the Danish version.

Opgavesæt til:

Skriftlig prøve: 26.06.2026

Kursus navn og nr.: **02323** Introduktion til statistik

Varighed: 4 timer

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner model TI30XS eller TI30XB

Vægtning: Spørgsmålene vægtes ligeligt (see detaljer nedenfor)

De endelige svar skal afleveres ved udfyldelse af det særskilte “Answer Sheet”.

Opgavesættet består af 30 multiple choice-spørgsmål fordelt på 12 opgaver. **Du skal kun aflevere dit “Answer Sheet” og ikke hele opgavesættet.**

Multiple choice spørgsmål: Eksamen består af 30 multiple choice-spørgsmål med mulige svar: 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (hvor 6 altid henviser til svaret ”Ved ikke/Intet svar”). Et korrekt svar giver 5 point, et forkert svar giver -1 point, og ”Ved ikke/Intet svar”(6) giver 0 point. Det er ikke tilladt at vælge mere end én svarmulighed for et enkelt spørgsmål. Hvis dette alligevel sker, gives der 0 point for spørgsmålet.

Brug af Python til denne eksamen: Denne eksamen indeholder Python kode. Bemærk at vi bruger de følgende biblioteker og forkortelser:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import scipy.stats as stats
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import statsmodels.stats.power as smp
import statsmodels.stats.proportion as smprop
```

Fortsæt på side 2

Opgave I

En studerende tager en multiple choice-eksamen med 30 spørgsmål. For hvert spørgsmål er der fem muligheder, hvor kun én er korrekt. Den studerende spekulerer på, hvad sandsynligheden er for at svare korrekt på mindst 15 spørgsmål, hvis han besvarer alle spørgsmål fuldstændig tilfældigt.

Spørgsmål I.1 (1)

Hvilken af følgende Python-kommandoer beregner den ønskede sandsynlighed?

1 ☐ `1 - stats.hypergeom.cdf(14, 30, 6, 15)`

2 ☐ `1 - stats.hypergeom.cdf(15, 30, 5, 15)`

3 ☐ `1 - stats.binom.cdf(14, 30, 1/5)`

4 ☐ `1 - stats.hypergeom.pmf(15, 30, 6, 14)`

5 ☐ `1 - stats.binom.pmf(15, 30, 1/5)`

6 ☐ Ved ikke / Intet svar

I eksamen får studerende 5 point for et rigtigt svar og -1 point for et forkert svar.

Spørgsmål I.2 (2)

Lad den stokastiske variabel Y være det samlede antal point opnået til eksamen, stadig under antagelse af at den studerende svarer fuldstændig tilfældigt, hvad er standardafvigelsen af Y ?

1 ☐ $\sqrt{30 \left(\frac{4}{5} + 5^2 \cdot \frac{1}{5} \right)} = \sqrt{174}$

2 ☐ $\sqrt{30 \left(1.2^2 \cdot \frac{4}{5} + 4.8^2 \cdot \frac{1}{5} \right)} = \sqrt{172.8}$

3 ☐ $30\sqrt{\frac{4}{5} + 5^2 \cdot \frac{1}{5}} = 30\sqrt{5.8}$

4 ☐ $30\sqrt{\frac{4}{5^2}} = 30\sqrt{0.16}$

5 ☐ $\sqrt{30 \cdot \frac{4}{5^2}} = \sqrt{4.8}$

6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 3

Opgave II

En forsker planlægger at undersøge effekten af et nyt lægemiddel, der reducerer antallet af restitutionsdage efter en bestemt procedure. I et tidligere pilotstudie blev det fundet, at patienter, som fik lægemidlet, i gennemsnit havde brug for 19 dage til at komme sig efter proceduren. Dette resultat virker lovende, da patienter, som ikke får lægemidlet, i gennemsnit har brug for 23 dage til at komme sig. Den estimerede standardafvigelse for antallet af restitutionsdage er 12 dage, og det antages, at denne standardafvigelse gælder både for patienter, der får lægemidlet, og dem, der ikke gør.

Da det tidligere pilotstudie kun var baseret på et lille antal patienter, planlægger forskeren at gennemføre en ny undersøgelse med en større stikprøve. Forskeren vil måle antallet af restitutionsdage i en stikprøve på n patienter og estimere det gennemsnitlige antal restitutionsdage, og det antages, at data er normalfordelte. Forskeren vil derefter teste, om dette gennemsnit er signifikant forskelligt fra 23 dage (nulhypotesen). Et signifikansniveau på $\alpha = 0.05$ vil blive anvendt, og forskeren ønsker, at undersøgelsen skal have en statistisk styrke på 70% ($1 - \beta = 0.70$) under en alternativ hypotese, hvor middelværdi og varians svarer til de værdier, der blev observeret i pilotstudiet.

For at besvare det følgende spørgsmål oplyses følgende fraktiler fra en standardnormalfordeling:

$z_{0.50}$	$z_{0.60}$	$z_{0.70}$	$z_{0.80}$	$z_{0.90}$	$z_{0.95}$	$z_{0.975}$	$z_{0.99}$	$z_{0.995}$
0.00	0.25	0.52	0.84	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58

Spørgsmål II.1 (3)

Hvor stor skal stikprøvestørrelsen n være?

1 ☐ 5

2 ☐ 42

3 ☐ 44

4 ☐ 56

5 ☐ 71

6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 4

Spørgsmål II.2 (4)

Hvilket af følgende udsagn er FALSK?

- 1 ☐ Risikoen for at begå en Type I-fejl i den nye undersøgelse er 5%.
- 2 ☐ Risikoen for at begå en Type II-fejl i den nye undersøgelse er 70%.
- 3 ☐ Signifikansniveauet α er det samme som risikoen for at begå en Type I-fejl.
- 4 ☐ Den statistiske styrke er det samme som *sandsynligheden for korrekt at forkaste nulhypotesen, hvis nulhypotesen er falsk*.
- 5 ☐ Hvis den sande effekt af lægemidlet er mindre end antaget, vil den statistiske styrke af undersøgelsen også være mindre.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 5

Opgave III

I en undersøgelse ønsker et universitet at undersøge, om niveauet for deklaration af Generativ AI i studerendes rapporter er forbundet med typen af akademisk projekt.

Efter indførelsen af et obligatorisk bibliotekskursus om ansvarlig brug af Generativ AI skal de studerende eksplicit angive i metodekapitlet, om de har brugt Generativ AI-værktøjer (såsom ChatGPT, Claude eller Copilot) som en del af deres projekt eller i forbindelse med skrivningen af deres rapporter.

Niveauet for AI-deklaration i rapporten klassificeres som: (1) Eksplicit deklaration (klart dokumenteret brug), (2) Delvis deklaration (nævner "hvad", men ikke "hvordan") og (3) Ingen deklaration.

Projekttypen klassificeres som: (1) Bachelorprojekt, (2) Kandidatspeciale og (3) Anden projektrapport.

I en tilfældig stikprøve på 240 studerendes rapporter er resultaterne opsummeret i tabellen nedenfor:

Projekttype:	AI-deklarationsniveau:			Total
	Eksplicit	Delvis	Ingen	
Bachelorprojekt	40	20	20	80
Kandidatspeciale	50	30	20	100
Anden rapport	10	20	30	60
Total	100	70	70	240

Forskeren ønsker at teste hypotesen om uafhængighed mellem Generativ AI-deklarationer og projekttype. Det ønskede signifikansniveau α er gemt i Python i en variabel kaldet `alpha`.

Spørgsmål III.1 (5)

Hvilken af følgende Python-kodelinjer beregner korrekt den kritiske værdi for den relevante hypotesetest?

1 ☐ `critical_value = stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, df = 239)`

2 ☐ `critical_value = stats.chi2.ppf(1 - alpha, df=4)`

3 ☐ `critical_value = stats.f.ppf(1 - alpha, dfn=2, dfd=4)`

4 ☐ `critical_value = stats.f.cdf(1 - alpha, dfn=2, dfd=6)`

5 ☐ `critical_value = stats.t.cdf(1 - alpha/2, df=8)`

6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål III.2 (6)

Ved brug af antalstabellen om deklaration af generativ AI i studenterrapporter (bachelorprojekter, kandidatspecialer og andre rapporter) ønsker en forsker nu at udføre en test for uafhængighed mellem deklaration af generativ AI og rapporttype ved hjælp af Python.

De observerede antal fra undersøgelsen er gemt i Python som følgende "array":

```
observed = np.array([[40, 20, 20],  
                    [50, 30, 20],  
                    [10, 20, 30]])
```

Hvilken af følgende Python-kodelinjer udfører korrekt testen for denne antalstabel?

1 ☐ `stats.chi2.cdf(observed)`

2 ☐ `stats.chi2.ppf(observed)`

3 ☐ `stats.chi2_contingency(observed)`

4 ☐ `stats.ttest_ind(observed)`

5 ☐ `stats.chi2.pdf(observed)`

6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 7

Opgave IV

En forsker undersøger dagligt online nyhedsforbrug (målt i minutter) blandt 20 brugere. De sorterede data er:

12, 18, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140

Spørgsmål IV.1 (7)

Hvad er værdien af P_{90} , den 90. percentil?

- 1 ☐ 125
- 2 ☐ 117.5
- 3 ☐ 140
- 4 ☐ 110
- 5 ☐ 100
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål IV.2 (8)

Forskeren udvider datasættet ved at inkludere én yderligere observation: 165 minutter. Forskeren definerer outliers (ekstreme observationer) som værdier, der ligger enten $1.5 \times \text{IQR}$ over tredje kvartil (Q_3) eller $1.5 \times \text{IQR}$ under første kvartil (Q_1). Ifølge forskerens definition, hvad er den øvre tærskelværdi for outliers, og er den nye observation på 165 minutter en outlier?

- 1 ☐ Den øvre tærskelværdi for outliers er 157.5, og derfor er observationen på 165 minutter en outlier.
- 2 ☐ Den øvre tærskelværdi for outliers er 162.5, og derfor er observationen på 165 minutter en outlier.
- 3 ☐ Den øvre tærskelværdi for outliers er 162.5, og derfor er observationen på 165 minutter ikke en outlier.
- 4 ☐ Den øvre tærskelværdi for outliers er 172.5, og derfor er observationen på 165 minutter ikke en outlier.
- 5 ☐ Den øvre tærskelværdi for outliers er 157.5, og derfor er observationen på 165 minutter ikke en outlier.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 8

Opgave V

Følgende stikprøve er tilgængelig:

$\mathbf{x} = [-2.71, -1.85, -1.12, -0.64, 0.17, 0.43, 0.88, 1.05, 1.34]$

Spørgsmål V.1 (9)

Hvad er medianen for stikprøven?

- 1 ☐ -0.24
- 2 ☐ -0.64
- 3 ☐ 0.30
- 4 ☐ 0.17
- 5 ☐ 0.43
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål V.2 (10)

Lad den i 'te observation i stikprøven være repræsenteret ved X_i , og antag, at $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, hvor observationerne er uafhængige og identisk fordelte (i.i.d.).


Hvad er fordelingen af stikprøvegennemsnittet $\bar{X}$, givet stikprøvestørrelsen $n = 10$?

- 1 ☐ t -fordelingen med 8 frihedsgrader
- 2 ☐ t -fordelingen med 9 frihedsgrader
- 3 ☐ Normalfordelingen $N(\mu, \sigma^2/n)$
- 4 ☐ χ^2 -fordelingen med 8 frihedsgrader
- 5 ☐ χ^2 -fordelingen med 9 frihedsgrader
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 9

Opgave VI

Figuren nedenfor viser gennemsnitlige årlige CO₂-koncentrationer som funktion af tid siden 1973 (dvs. den sidste observation er 2024) ved en specifik målestation.



Spørgsmål VI.1 (11)

Lad r betegne den empiriske korrelationskoefficient mellem "Tid" og CO₂-koncentration. Hvilket af følgende udsagn om r kunne være korrekt?

- 1 ☐ $r \approx 0.8$
- 2 ☐ $r \approx 0$
- 3 ☐ $r \approx 0.99$
- 4 ☐ $r \approx -0.5$
- 5 ☐ $r \approx 0.5$
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

For at undersøge udviklingen i CO₂-koncentrationen som funktion af tid, er følgende analyse blevet udført i Python (`value` betegner CO₂-koncentrationen, og `co2` er en dataframe, der indeholder de ovenfor viste data). Nogle værdier er blevet erstattet af bogstaver.

Fortsæt på side 10

```
fit1 = smf.ols(formula = "value ~ time", data = co2).fit()
print(fit1.summary(slim=True))
```

OLS Regression Results

```
=====
```

Dep. Variable:	value	R-squared:	R2
Model:	OLS	Adj. R-squared:	R2a
No. Observations:	51	F-statistic:	4128.
Covariance Type:	nonrobust	Prob (F-statistic):	5.68e-49

```
=====
```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	325.14	0.86	t1	p1	l1	u1
time	1.84	0.03	t2	p2	l2	u2

```
=====
```


```
print(np.sqrt(fit1.scale))
3.00
```

Spørgsmål VI.2 (12)

Hvad er de omtrentlige værdier af l2 og u2?

- 1 ☐ l2 ≈ 1.42, u2 ≈ 2.26
- 2 ☐ l2 ≈ 1.78, u2 ≈ 1.90
- 3 ☐ l2 ≈ 1.00, u2 ≈ 2.68
- 4 ☐ l2 ≈ 1.83, u2 ≈ 1.85
- 5 ☐ l2 ≈ 0.16, u2 ≈ 3.52
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

For at validere modellens antagelser har man lavet nedenstående diagnostiske plots (baseret på den ovenfor præsenterede model).



Spørgsmål VI.3 (13)

Baseret på de diagnostiske plots, hvilket af følgende udsagn er korrekt (alle dele af svaret skal være korrekte)?

- 1 ☐ Uafhængighedsantagelsen er tydeligvis overtrådt (Q-Q-plottet), og variansen af residualerne afhænger af niveauet (Residuals vs. Fittet).
- 2 ☐ En datatransformation bør overvejes (Q-Q-plot), og "Residual vs. Fitted" antyder en logaritmisk transformation.
- 3 ☐ "Q-Q-plottet" antyder, at normalitetsantagelsen er opfyldt (de fleste punkter ligger på den rette linje), yderligere ser det ud til, at korrelationen mellem "fittede" værdier og residualer er tæt på nul, og derfor synes alle antagelser at være opfyldt.
- 4 ☐ "Q-Q-plottet" antyder, at systematiske effekter mangler i modellen, og yderligere antyder "Residuals vs. Fitted", at residual variansen er en funktion af fittede værdier.
- 5 ☐ Normalitetsantagelsen synes ikke at være opfyldt (Q-Q-plottet), og der er tydeligvis systematiske effekter, som ikke er inkluderet i modellen (Residual vs. Fitted).
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 12

Opgave VII

I denne opgave betragter vi de kvartalsvise m^2 -priser for lejligheder i København fra første kvartal 2010 til fjerde kvartal 2025. Nogle rækker fra datasættet er givet nedenfor:

Observation	Kvartal	Pris (DKK)	t
1	Q1 2010	22,735	0
2	Q2 2010	23,654	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
63	Q3 2025	64,719	62
64	Q4 2025	69,192	63

Variablen t angiver antallet af kvartaler siden Q1 2010 og vil fungere som den uafhængige variabel i den simple lineære regressionsmodel:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 t_i + \varepsilon_i,$$


hvor Y_i er prisen for observation i , og fejlleddene $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ er uafhængige og ensfordelte.

Den lineære regression fittes i Python med mindste kvadraters metode, og outputtet fra Python er vist nedenfor:

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	price_m2		R-squared:	0.950		
Model:	OLS		Adj. R-squared:	0.949		
No. Observations:	64		F-statistic:	1169.		
Covariance Type:	nonrobust		Prob (F-statistic):	5.98e-42		
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

Intercept	1.899e+04	674.150	28.170	0.000	1.76e+04	2.03e+04
t	631.3005	18.461	34.196	0.000	594.397	668.204
=====						

Den fittede regressionslinje er vist sammen med datapunkterne i figuren nedenfor.



Spørgsmål VII.1 (14)

Hvad er den observerede teststørrelse for testen af nulhypotesen $\mathcal{H}_0 : \beta_1 = 600$?

- 1 ☐ $t_{\text{obs}} = 0.950$
- 2 ☐ $t_{\text{obs}} = 1.695$
- 3 ☐ $t_{\text{obs}} = 4.017$
- 4 ☐ $t_{\text{obs}} = 28.170$
- 5 ☐ $t_{\text{obs}} = 34.196$
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 14

Spørgsmål VII.2 (15)

Hvilket udsagn er inkonsistent med plottet af den fittede regressionsmodel?

- 1 ☐ Observationen i Q1 2026 vil med stor sandsynlighed resultere i et stort negativt residual.
- 2 ☐ Residualvariansen kunne variere over tid (t).
- 3 ☐ Residualerne kunne afhænge af tiden (t).
- 4 ☐ Residualernes stikprøvegennemsnit kunne være nul.
- 5 ☐ Nogle residualer kunne være afhængige af hinanden.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål VII.3 (16)

Antag at modelantagelserne er opfyldt. Hvilket af følgende udsagn er korrekt?


- 1 ☐ Modellen forklarer 95% af variationen i de kvartalsvise priser, og korrelationen mellem pris og tid (t) er 0.95.
- 2 ☐ Modellen forklarer 97.5% af variationen i de kvartalsvise priser, og korrelationen mellem pris og tid (t) er 0.95.
- 3 ☐ Modellen forklarer 95% af variationen i de kvartalsvise priser, og korrelationen mellem pris og tid (t) er 0.975.
- 4 ☐ Modellen forklarer 97.5% af variationen i de kvartalsvise priser, og korrelationen mellem pris og tid (t) er 0.975.
- 5 ☐ Modellen forklarer 95% af variationen i de kvartalsvise priser, men korrelationen mellem pris og tid (t) kan ikke bestemmes uden yderligere information.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 15

Opgave VIII

Vi betragter data om pingviner fra tre forskellige arter: **Adelie**, **Chinstrap** og **Gentoo**. Data er lagret i en Pandas DataFrame med navnet **penguins** og indeholder variablerne: **species**, **flipper_length_mm** og **body_mass_g**.

Data er visualiseret i figurerne nedenfor:



Nøgletal ("summary statistics") for hver art er:

Art	n	Svømmefinnelængde (mm)		Kropsmasse (g)	
		Middelværdi	Std. afv.	Middelværdi	Std. afv.
Adelie	151	189.95	6.54	3700.7	458.6
Chinstrap	68	195.82	7.13	3733.1	384.3
Gentoo	123	217.19	6.48	5076.0	504.1

Antag, at både svømmefinnelængde og kropsmasse inden for hver art er tilnærmelsesvis normalfordelte.

For at besvare følgende spørgsmål kan du få brug for en eller flere af følgende fraktiler ($t_{1-\alpha,\nu}$ er $1 - \alpha$ -fraktilen i en t -fordeling med ν frihedsgrader):

Antal frihedsgrader	$t_{0.95,\nu}$	$t_{0.975,\nu}$	$t_{0.995,\nu}$
$\nu = 67$	1.668	1.996	2.651
$\nu = 120$	1.658	1.980	2.617
$\nu = 122$	1.657	1.980	2.617
$\nu = 150$	1.655	1.976	2.609
$\nu = 200$	1.653	1.972	2.601
$\nu = 250$	1.651	1.969	2.596
$\nu = 300$	1.650	1.968	2.592

Spørgsmål VIII.1 (17)

Hvad er det sædvanlige 95% konfidensinterval for middelværdien af svømmefinnelængden for Chinstrap pingviner?

- 1 ☐ [195.7; 195.9]
- 2 ☐ [176.9; 214.7]
- 3 ☐ [183.9; 207.7]
- 4 ☐ [194.1; 197.5]
- 5 ☐ [181.5; 210.1]
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

En ældre kilde angiver, at den gennemsnitlige svømmefinnelængde for Chinstrap-pingviner er $\mu_0 = 190$ mm. Brug stikprøvedataene fra den aktuelle undersøgelse til at teste

$$H_0 : \mu = 190 \quad \text{mod} \quad H_1 : \mu \neq 190.$$

Spørgsmål VIII.2 (18)

Hvad er den korrekte teststørrelse og konklusionen af testen, ved signifikansniveau $\alpha = 0.05$?

- 1 ☐ Teststørrelsen bliver $t \approx 0.816$, og konklusionen er, at den observerede gennemsnitlige svømmefinnelængde for Chinstrap-pingviner IKKE er signifikant forskellig fra 190 mm (da 0.816 er mindre end 1.996).
- 2 ☐ Teststørrelsen bliver $t \approx 0.816$, og konklusionen er, at den observerede gennemsnitlige svømmefinnelængde for Chinstrap-pingviner ER signifikant forskellig fra 190 mm (da 0.816 er større end 0.05).
- 3 ☐ Teststørrelsen bliver $t \approx 6.73$, og konklusionen er, at den observerede gennemsnitlige svømmefinnelængde for Chinstrap-pingviner ER signifikant forskellig fra 190 mm (da 6.73 er større end 1.996).
- 4 ☐ Teststørrelsen bliver $t \approx 6.73$, og konklusionen er, at den observerede gennemsnitlige svømmefinnelængde for Chinstrap-pingviner IKKE er signifikant forskellig fra 190 mm (da 6.73% er større end 5%).
- 5 ☐ Teststørrelsen bliver $t \approx 5.45$, og konklusionen er, at den observerede gennemsnitlige svømmefinnelængde for Chinstrap-pingviner IKKE er signifikant forskellig fra 190 mm (da 5.45% er større end 5%).
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Vi ønsker at undersøge, om der er en signifikant forskel i den gennemsnitlige kropsmasse mellem **Adelie**- og **Chinstrap**-pingviner, hvilket svarer til at teste

$$H_0 : \mu_A = \mu_C \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_A \neq \mu_C.$$

Vi anvender signifikansniveau $\alpha = 0.05$ og bruger en to-sample t -test, der antager ens varians i de to grupper. Til dette formål kan du anvende det sammenvægtede to-sample estimat for variansen (estimeret ud fra Adelie- og Chinstrap-stikprøverne):

$$s_p^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_C - 1)s_C^2}{n_A + n_C - 2} = 190977 = 437^2.$$

Spørgsmål VIII.3 (19)

Hvilket af følgende udsagn er SANDT?

- 1 ☐ Den estimerede forskel $\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_C$ er -32.4 gram, hvilket er en signifikant forskel, da den er mindre end 0.05% af den gennemsnitlige kropsmasse for både Adelie- og Chinstrap-pingviner.
- 2 ☐ Den relevante teststørrelse er omtrent $t = -0.07$, og den endelige konklusion er, at der er en signifikant forskel i kropsmasse mellem Adelie- og Chinstrap-arterne, da $|-0.07| = 0.07$ er større end 0.05 .
- 3 ☐ Den relevante teststørrelse er omtrent $t = -0.5$, og den endelige konklusion er, at vi IKKE finder en statistisk signifikant forskel i den gennemsnitlige kropsmasse mellem Adelie- og Chinstrap-arterne.
- 4 ☐ Den relevante teststørrelse er omtrent $t = -0.5$, men givet informationen i opgaven er vi ikke i stand til at afgøre, om forskellen er signifikant eller ej.
- 5 ☐ Den relevante teststørrelse er omtrent $t = -0.07$, og den endelige konklusion er, at vi IKKE finder en signifikant forskel i kropsmasse mellem Adelie- og Chinstrap-arterne, da $|-0.07| = 0.07$ er større end 0.05 .
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 18

Spørgsmål VIII.4 (20)

Hvilket udsagn er SANDT vedrørende den sammenvægtede to-sample t -test?

- 1 ☐ Metoden antager, at de to populationer har ens varians.
- 2 ☐ Metoden kræver ens stikprøvestørrelser i de to grupper.
- 3 ☐ Metoden er uegnet, fordi stikprøvestørrelserne er større end 30.
- 4 ☐ Metoden tillader, at de to populationer har forskellige varianser og justerer frihedsgraderne derefter.
- 5 ☐ Metoden tester, om de to stikprøvevarianser er ens.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 19

Opgave IX

En forsker modellerer dagligt nyhedsforbrug (i minutter) ved hjælp af en normalfordeling med middelværdi 90 og standardafvigelse 10, baseret på nogle data.

Spørgsmål IX.1 (21)

Hvilken af følgende Python-kommandoer på én linje genererer korrekt tilfældige stikprøver fra denne fordeling?

- 1 ☐ `scipy.stats.norm.cdf(90, loc=90, scale=10)`
- 2 ☐ `scipy.stats.norm.pdf(90, loc=90, scale=10)`
- 3 ☐ `scipy.stats.norm.ppf(0.90, loc=90, scale=10)`
- 4 ☐ `scipy.stats.norm.pmf(90, loc=90, scale=10)`
- 5 ☐ `scipy.stats.norm.rvs(loc=90, scale=10, size=10)`
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 20

Opgave X

En transportforsker undersøger, om tilslutningsraten for elbiler (EVs) er steget, efter at regeringen indførte incitamenter såsom gratis kommunal parkering og udbygget ladeinfrastruktur.

I et lille pilot studiet gennemført før incitamenterne viste det sig, at omkring 15% af husstandene ejede en elbil. Da pilotundersøgelsen var relativt lille ($n = 20$ husstande), er estimatet på 15% forbundet med betydelig usikkerhed.

For at planlægge en større opfølgende undersøgelse ønsker forskeren at estimere den sande andel af husstande, der ejer en elbil efter incitamenterne. Forskeren ønsker at konstruere et 95% konfidensinterval med en *Margin of Error* (ME) på kun 6%.

Spørgsmål X.1 (22)

Hvilken minimums stikprøvestørrelse n kræves for den opfølgende undersøgelse, hvis det antages, at den sande andel er lig med andelen fundet i pilot studiet?

- 1 ☐ $n = 120$
- 2 ☐ $n = 137$
- 3 ☐ $n = 210$
- 4 ☐ $n = 260$
- 5 ☐ $n = 310$
- 6 ☐ Ved ikke / intet svar

Forskeren udfører senere en undersøgelse af 300 husstande. Med resultatet

- Før incitamenterne: 36 ud af 150 husstande ejede en elbil.
- Efter incitamenterne: 51 ud af 150 husstande ejede en elbil.

Forskeren ønsker at teste, om andelen af elbilejere ændrede sig efter incitamenterne ved brug af signifikansniveauet $\alpha = 0.05$.

Fortsæt på side 21

Spørgsmål X.2 (23)

Hvilken af følgende konklusioner er korrekt?

- 1 ☐ $z_{obs} = 1.91 < 1.96$, så vi forkaster ikke H_0 og kan IKKE konkludere, at EV-udbredelsen er steget signifikant.
- 2 ☐ $z_{obs} = 1.45 < 1.96$, så vi forkaster ikke H_0 og konkluderer, at EV-udbredelsen ikke er steget signifikant.
- 3 ☐ $z_{obs} = 0.87 < 1.96$, så vi forkaster ikke H_0 og konkluderer, at EV-udbredelsen ikke er steget signifikant.
- 4 ☐ $z_{obs} = 1.91 < 1.96$, så vi forkaster ikke H_0 og konkluderer, at EV-udbredelsen er steget signifikant.
- 5 ☐ $z_{obs} = 3.02 > 1.96$, så vi forkaster H_0 og konkluderer, at EV-udbredelsen er steget signifikant.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 22

Opgave XI

En forsker analyserer toksiciteten af forskellige lægemidler mod en hjerte-kar-sygdom med en ensidet variansanalyse, som giver anledning til følgende variansanalysekema:

Kilde	DF	SS
Lægemiddel	3	33.66
Residual	36	220.20
Total	39	253.86

Spørgsmål XI.1 (24)

Givet at modelantagelserne er opfyldt, hvad er den observerede F -teststørrelse for nulhypotesen om, at den gennemsnitlige toksicitet (middelvirkning) er den samme for alle lægemidlerne, mod den sædvanlige alternativhypotese?

- 1 ☐ $F_{\text{obs}} = 11.22$
- 2 ☐ $F_{\text{obs}} = 6.12$
- 3 ☐ $F_{\text{obs}} = 1.83$
- 4 ☐ $F_{\text{obs}} = 0.55$
- 5 ☐ $F_{\text{obs}} = 0.15$
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål XI.2 (25)

Den observerede F -teststørrelse skal sammenlignes med en fraktil fra hvilken fordeling ved test af nulhypotesen om, at den gennemsnitlige toksicitet (middelvirkning) er den samme for alle lægemidlerne, mod den sædvanlige alternativhypotese?

- 1 ☐ En F -fordeling med $\nu_1 = 3$ og $\nu_2 = 36$ frihedsgrader.
- 2 ☐ En F -fordeling med $\nu_1 = 4$ og $\nu_2 = 39$ frihedsgrader.
- 3 ☐ En F -fordeling med $\nu_1 = 36$ og $\nu_2 = 39$ frihedsgrader.
- 4 ☐ En t -fordeling med $\nu = 36$ frihedsgrader.
- 5 ☐ En t -fordeling med $\nu = 39$ frihedsgrader.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål XI.3 (26)

Hvad er den estimerede standardafvigelse for residualerne i variansanalysen?

- 1 ☐ 220.20
- 2 ☐ 14.84
- 3 ☐ 6.12
- 4 ☐ 3.35
- 5 ☐ 2.47
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål XI.4 (27)

Bonferroni-korrektionen bruges til at korrigere signifikansniveauet (α), når der udføres multiple test. Hvilket af følgende udsagn om effekten på risikoen for type I- og type II-fejl er korrekt for Bonferroni-korrektionen?

- 1 ☐ Bonferroni-korrektionen øger type I-risikoen, men reducerer type II-risikoen for de individuelle hypotesetest.
- 2 ☐ Bonferroni-korrektionen reducerer type I-risikoen, men øger type II-risikoen for de individuelle hypotesetest.
- 3 ☐ Bonferroni-korrektionen øger type I-risikoen og reducerer styrken af de individuelle hypotesetest.
- 4 ☐ Bonferroni-korrektionen reducerer type I-risikoen og øger styrken af de individuelle hypotesetest.
- 5 ☐ Bonferroni-korrektionen øger type I-risikoen for de individuelle hypotesetest, men reducerer den familiemæssige (family-wise) type I-risiko.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 24

Opgave XII

Lad X være en diskret stokastisk variabel, som antager værdier i de ikke-negative heltal. Vi betegner tæthedsfunktionen (pdf) med f og fordelingsfunktionen (cdf) med F . Tabellen nedenfor viser nogle værdier af F :

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(x)$	0.05	0.12	0.14	0.24	0.25	0.48	0.68	0.80	0.89	0.97	1.00

Spørgsmål XII.1 (28)

Hvad er det mest sandsynlige udfald af X ?

- 1 ☐ Det mest sandsynlige udfald af X er 3.
- 2 ☐ Det mest sandsynlige udfald af X er 4.
- 3 ☐ Det mest sandsynlige udfald af X er 5.
- 4 ☐ Det mest sandsynlige udfald af X er 6.
- 5 ☐ Det mest sandsynlige udfald af X er 10.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Spørgsmål XII.2 (29)

Hvad er sandsynligheden $\mathbb{P}(3 \leq X \leq 8)$?

- 1 ☐ 0.83
- 2 ☐ 0.75
- 3 ☐ 0.73
- 4 ☐ 0.66
- 5 ☐ 0.65
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

Fortsæt på side 25

Spørgsmål XII.3 (30)

Vi definerer q -fraktilen som den mindste værdi x , der opfylder $\mathbb{P}(X \leq x) \geq q$. Hvad er 15%-fraktilen i fordelingen af X ?

- 1 ☐ 15%-fraktilen i fordelingen af X er 2.0.
- 2 ☐ 15%-fraktilen i fordelingen af X er 2.1.
- 3 ☐ 15%-fraktilen i fordelingen af X er 2.5.
- 4 ☐ 15%-fraktilen i fordelingen af X er 3.0.
- 5 ☐ 15%-fraktilen i fordelingen af X er 8.0.
- 6 ☐ Ved ikke / Intet svar

SÆTTET ER SLUT. Nyd ferien!